



TEVA

pomagamy
społeczeństwu

Warszawa, 24 czerwca 2015r.

Informacja prasowa

W klimacie kaszlu

Powoli rozpoczynamy sezon „klimatyzacji”, która wysusza powietrze, przez co śluzówki górnych dróg oddechowych narażone są na wysychanie. Z pewnością duża część osób pracujących w biurze doświadczyła wielokrotnie skutków dużej różnicy temperatur – zapalenie gardła albo kaszel, znamy to prawda? Flegamina i Supremin to rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.

Kaszel to bardzo uporczywy objaw grypy lub przeziębienia, często bagatelizowany z uwagi na to, że nie zawsze towarzyszy mu gorączka czy ogólne osłabienie. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie marek m.in.: Flegamina i Supremin, aż **86%** z badanych ma świadomość, że kaszląc można zarazić inne osoby, a pomimo to aż **53%** chodzi do pracy pomimo kaszlu, a jedynie **18%** deklaruje, że tego nie robi¹.

Jak zminimalizować ryzyko zarażenia w pracy krążącą infekcją? Poniżej kilka sprawdzonych metod:

- Przecieraj sprzęty biurowe codziennego użytku antybakteryjną chusteczką przynajmniej raz na dwa tygodnie
- Wietrz pomieszczenia w przerwach pracy klimatyzacji
- Myj ręce kilka razy dziennie
- Staraj się używać swojego własnego kubka
- Stosuj skuteczne leki, kiedy pojawią się pierwsze objawy – kaszel jest jednym z najczęstszych objawów zwiastujących grypę lub przeziębienie.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informację dotyczącą stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.

¹Leki OTC / suplementy diety – raport z badania ilościowego.

**TEVA**pomagamy
społeczeństwu

Aż **97%** badanych uważa syrop **Flegaminę** za efektywny i bezpieczny. **62%** za efektywny uważa też syrop **Supremin**, a **64%** potwierdza, że jest bezpieczny. Warto wiedzieć, że **49%** pacjentów stosuje leki, aby zatrzymać kaszel na etapie kaszlu suchego².

Flegamina to znany i sprawdzony przez miliony Polaków³ lek na kaszel mokry. Wykazuje następujące działania: rozrzedza zalegającą wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszenie, oczyszcza oskrzela, ułatwiając oddychanie i chroniąc przed zaleganiem wydzieliny w drzewie oskrzelowym. Preparaty z gamy leków **Flegamina** mogą być stosowane u dzieci w wieku 2 lat (syrop **Flegamina** o smaku truskawkowym). Dlatego ważną kwestią jest wybór formy i smaku, dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. Należy pamiętać, że pozostałe preparaty mogą być stosowane od 7. roku życia.

Supremin to lek na kaszel suchy dla całej rodziny, który można stosować u dorosłych i dzieci, które ukończyły 2 lata. **Supremin** dzięki substancji czynnej (butamirat) szybko się wchłania⁴ i hamuje męczący kaszel oraz nieznacznie rozkurcza mięśniówkę oskrzeli.

Więcej informacji udziela:

Katarzyna Pęcherska

Kierownik ds. Komunikacji Produktu

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

katarzyna.pecherska@teva.pl; tel. 695 363 585www.teva.pl

oraz

Aleksandra Daniszewska

Hill+Knowlton Strategies

tel. kom. 607 911 220, e-mail: aleksandra.daniszewska@hkstrategies.com

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) jest wiodącą globalną firmą farmaceutyczną, której celem jest zwiększanie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej poprzez rozwój, produkcję oraz sprzedaż leków generycznych oferowanych po przystępnych cenach, jak również innowacyjnych i specjalistycznych produktów farmaceutycznych i substancji czynnych leków. Teva z siedzibą w Izraelu oraz z bezpośrednimi przedstawicielstwami w blisko 60 krajach jest największym na świecie producentem leków generycznych z portfelem produktów zawierającym ponad 1 000 cząsteczek. Działalność związana z produkcją leków innowacyjnych koncentruje się na takich obszarach terapeutycznych jak neurologia, onkologia, leczenie bólu, choroby układu oddechowego i zdrowie kobiet, a także biofarmaceutyki. Teva zatrudnia obecnie blisko 46 000 pracowników na całym świecie, a jej wartość przychodów ze sprzedaży netto w 2012 roku wyniosła 20,3 mld USD.

PO/FLG/15/0010

²IPSO omnibus on cough report TEVA; badanie na reprezentatywnej grupie 1000 osób

³Poland National OTC Sales Report, 01A2 EXPECTORANTS, Units 2010-YTD 08/2011, IMS Health and its affiliates, All rights reserved.

⁴<http://www.teva.pl/Media/News/Pages/2014/Supermin-%E2%80%93-Super-na-suchy-kaszel.aspx?year=2014>



TEVA

pomagamy
 społeczeństwu

Nazwa:

Flegamina o smaku miętowym, 4 mg/5 ml, syrop
Flegamina o smaku miętowym bez cukru, 4 mg/5 ml, syrop
Flegamina o smaku malinowym, 4 mg/5 ml, syrop
Flegamina o smaku truskawkowym 2 mg/5ml, syrop
Flegamina 8 mg, tabletki
Bromhexinihydrochloridum

Postać:

Tabletki i syrop

Skład:

5 ml (1 łyżka miarowa) syropu Flegamina o smaku miętowym, Flegamina o smaku miętowym bez cukru i Flegamina o smaku malinowym zawiera jako substancję czynną 4 mg bromoheksyny chlorowodoru.

5 ml (1 łyżka miarowa) syropu Flegamina o smaku truskawkowym zawiera jako substancję czynną 2 mg bromoheksyny chlorowodoru.

Jedna tabletki zawiera jako substancję czynną 8 mg bromoheksyny chlorowodoru.

Opakowania:

Butelka zawierająca 120 ml lub 200 ml syropu, w tekturowym pudełku.

20, 40 lub 60 tabletek w opakowaniu.

Czym są leki Flegamina i w jakim celu się je stosuje?

Flegamina o smaku miętowym, Flegamina o smaku miętowym bez cukru i Flegamina o smaku malinowym w postaci syropu oraz Flegamina w postaci tabletek zawierają substancję czynną chlorowodorek bromoheksyny, który jest lekiem wykrztuśnym, upłynniającym wydzielinę z dróg oddechowych. Lek ten ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli.

Wskazania do stosowania:

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na bromoheksynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu. Flegamina, ze względu na zawartość laktozy jednowodnej, jest przeciwwskazana u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Flegamina o smaku miętowym, Flegamina o smaku miętowym bez cukru i Flegamina o smaku malinowym jest przeciwwskazana u dzieci poniżej 7 lat ze względu na zawartość alkoholu.

Jak stosować leki Flegamina?

Leki Flegamina przeznaczone są do stosowania doustnego, w równych odstępach czasu, po posiłku. Nie zająć leku bezpośrednio przed snem.





TEVA

pomagamy społeczeństwu

Nie jest wskazane stosowanie leku Flegamina w postaci tabletek u dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które nie są w stanie połknąć tabletki; u tych pacjentów zaleca się stosowanie leku w postaci syropu Flegamina o smaku truskawkowym.

Leki: Flegamina o smaku miętowym, Flegamina o smaku miętowym bez cukru i Flegamina o smaku malinowym

Dla dorosłych i dzieci od 7 lat.

Lek Flegamina o smaku truskawkowym

Dla dorosłych i dzieci od 6. miesiąca życia; nie zawiera alkoholu.

Lek Flegamina

Dla dorosłych i dzieci od 3 lat.

Podmiot odpowiedzialny:

TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, tel.: (22) 345 93 00

Nazwa

**Supremin 4 mg/5 ml, syrop
(Butamiraticitras)**

Postać:

Syrop

Opakowanie:

Butelka zawierająca 200 ml syropu w tekturowym pudełku.

Skład jakościowy i ilościowy:

5 ml (1 łyżeczka) syropu zawiera 4 mg cytrynianu butamiratu.

Co to jest lek Supremin i w jakim celu sięgo stosuje?

Supremin w postaci syropu zawiera jako substancję czynną cytrynian butamiratu, który jest nieopiodowym lekiem przeciwkaszlowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu poprzez hamowanie odruchu kaszlowego. Obok działania przeciwkaszlowego butamiratu nieznacznie rozszerza oskrzela.

Wskazania:

Supremin jest lekiem przeciwkaszlowym, wskazanym do stosowania w ostrym, suchym kaszlu.

Przeciwwskazania:

W przypadku nadwrażliwości na butamiratu lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku oraz u pacjentów z fenyloketonurią.

Jak stosować lek Supremin?

Lek do stosowania doustnego.

Dla całej rodziny, również dla dzieci już od 2. roku życia.

Lek należy stosować przed posiłkami.

Podmiot odpowiedzialny: TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, tel. +48-22-3459340

